

Primær scleroserende cholangit

PATIENTINFORMATION VEDR. PRIMÆR SKLEROSERENDE KOLANGIT

Hvad er det:

PSC er en sjælden sygdom, som oftest ses ved kroniske tarmsygdomme i tyktarmen, men den kan også ses uden tarmsygdom.

Hvilke symptomer kan der opstå:

Sygdommen giver langsomt symptomer i form af:

- hudkløe
- gulsot
- måske feber og træthed
- mørk urin og lys afføring

Undersøgelser der kan afsløre diagnosen:

- Leverprøver hvor man kan måle graden af gulsot (bilirubin), forhøjelse af nogle af de enzymer der dannes i leveren (basisk fosfatase).
- Kikkertundersøgelse af lever, galdeveje og bugspytkirtel - kaldet ERCP. Ved denne undersøgelse kan man se, at galdegangene er blevet forsnævrede, nogle steder som følge af betændelsesreaktion. Derved kan galden have svært ved at passere ud i tarmen og medvirke ved fordøjelse af føden.
- Vævsprøve af leveren til mikroskopi
- Evt. kikkertundersøgelse af tarmen kaldet koloskopi, for at konstatere om man samtidig skulle have kronisk tarmbetændelse, uden at den giver symptomer. Tarmbetændelsen kan i så fald behandles med medicin.

Hvilken behandling findes:

Behandling af PSC er symptomatisk, d.v.s. man kan give medicin til at fortynde galden, så den lettere kan passere galdegangen ud i tarmen.

Alkoholindtagelse i stor mængde frarådes, da leveren allerede er irriteret og alkohol er leverskadeligt.

Der anbefales jævnlig kontrol og blodprøvetagning på sygehus/ved speciallæge.